

Mouxine Maggots[®] HP

Insecticide adulticide

Caractéristiques

- ▶ Contient de la cyromazine, un insecticide larvicide de la famille des triazines.
- ▶ Bloque la synthèse de la cuticule épidermique de chitine des larves ce qui provoque leur mort.
- ▶ Utilisable en épandage à sec, en pulvérisation ou en arrosage pour une protection d'environ 4 à 8 semaines.
- ▶ Très facile d'emploi et s'utilise dans tous les bâtiments d'élevage.

Composition

Cyromazine	
[CAS 66215-27-8].....	20 g/kg
Extrait de margousier	
[CAS 84696-25-3].....	0,1 g/kg

Propriétés physico-chimiques

- ▶ État physique : solide sous forme de granulés blancs

Efficacité

Dose d'emploi élevage

- ▶ 250 g pour 10 m² de surface à traiter

Mode d'emploi

Dose d'application pour 10 m² de surface traitée

- ▶ Surface liquide ou très humide : 250 g en épandage à sec.
- ▶ Surface peu humide : 250 g mélangés dans 1 à 4 L d'eau [selon l'humidité] appliqués au pulvérisateur.
- ▶ Sur litière sèche : 250 g mélangés dans 10 L d'eau appliqués à l'arrosoir.

Traitement en élevage porcin, bovin, avicole, cunicole, veaux de boucherie, etc.

- ▶ Sur caillebotis et lisier fluide : épandage à sec.
- ▶ Sur caillebotis et lisier croûté : en pulvérisation ou avec un arrosoir.
- ▶ Sur paille neuve ou litière accumulée : en pulvérisation ou avec un arrosoir.
- ▶ Sur litière des bovins :
 - Dans les cases pour jeunes animaux, appliquer la solution sur toute la surface de paillage.
 - Dans les cases pour génisses et gros bovins, appliquer la solution autour des cases et aux abords des murs [bande de 0,5 à 1 m de large].
 - Traiter si possible après un nouveau paillage.

Pour une lutte efficace sur les insectes volants et rampants, appliquer au préalable un traitement larvicide avec Mouxine Twenty One.

Réglementation

Produit biocide insecticide TP18
Usage réservé aux professionnels.

Conditions de stockage et d'utilisation

Durée de conservation : 2 ans. Stocker dans les contenants d'origine et hermétiquement fermés. Dans un endroit bien ventilé, frais, sec et inaccessible pour les enfants et les animaux domestiques, à l'écart des denrées alimentaires, des boissons et des matières premières d'origine animale.

L'applicateur doit porter des équipements de protection individuelle [EPI] pour l'utilisation du produit : porter des gants lors de la manipulation du produit, se laver les mains après chaque utilisation.

Specifications du produit

Traiter hors de portée des animaux et de tout endroit destiné à recevoir les aliments ou susceptible d'être léchés. Appliquer le produit uniquement dans des étables vides. Dans les exploitations laitières, couvrir soigneusement les fourrages, les dispositifs d'alimentation et les abreuvoirs ainsi que les machines à traire et les attaches pour animaux. Les animaux peuvent réentrer dans les bâtiments dans la journée après application.

Présentation


- Seau de 5 kg
- Seau de 10 kg
- Sac de 20 kg



Utiliser les produits biocides avec précaution

Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit

ZONE D'APPLICATION PRÉCONISÉE



MENTIONS DE DANGER

H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

