

FICHE TECHNIQUE TENEDROP®


Lutte biologique contre les ténébrions

Le ténébrion *Alphitobius diaperinus*

TENEDROP® piège le ténébrion *Alphitobius diaperinus*, coléoptère ailé très fréquemment observé en élevage de volailles. Cet insecte peut avoir des effets néfastes

- directs sur les volailles : nervosisme, chute de ponte, retards de croissance, dissémination de maladies
- indirects, en détruisant les isolants thermiques

Quelques éléments du cycle biologique du ténébrion



- Cycle complet avec larve vermiforme et nymphe immobile
- Femelle adulte $\Rightarrow$ 3,5 œufs / jour, agglutinés en grappe (jusqu'à 28 œufs)
- La larve évolue dans la litière (6 à 12 mues avant nymphose)
- Avant transformation en adulte (imago), forage par la larve d'une chambre de nymphose dans les matériaux isolants.

source : ANSES



TENEDROP®, un piège de masse simple à utiliser



Comment utiliser TENEDROP® ?

- Positionner les pièges le long des lignes d'alimentation, près des entrées (sas, trappes d'accès aux parcours...) et des murs côté chauffage,
- Mettre une poignée d'aliment volaille dans le collecteur,
- Contrôler visuellement le piège et le vider une fois le collecteur rempli.





CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT
DE SOLUTIONS INNOVANTES
EN HYGIENE, NUTRITIONNEL
ET INSEMINATION ANIMALE

11 Rue Marie Curie
35137 Pleumeleuc
Tél. : +33 (0)2 99 06 10 06
Fax : +33 (0)2 99 06 10 11
www.syntheseelevage.com
E-mail : contact@syntheseelevage.com

LES POINTS IMPORTANTS A RESPECTER

- ⇒ Renforcer l'attractivité de **TENEDROP®** en mettant dans le collecteur une poignée d'aliment volaille.
- ⇒ **Contrôler régulièrement le remplissage du collecteur** pour éliminer les ténébrions piégés.