

Specifications du produit

Prophyl[®] S

Désinfectant de surfaces

Caractéristiques

Il s'agit d'un désinfectant spécial pour la biosécurité du bétail, des véhicules et des pédiluves, destiné à être utilisé dans les environnements d'élevage.

Composition

Concentré liquide soluble :

- Chlorocrésol [CAS 59-50-7]17,0 %
- Acide glycolique [CAS 79-14-1]4,9 %

Efficacité | Testé sur des surfaces non poreuses

USAGE	DOSE [TEMPS DE CONTACT]	SOUCHES CIBLES *	APPLICATION
Trempage	2,0 % [1 min]	bactéries et levures	Pédiluves
	2,0 % [5 min]	bactéries, levures et virus enveloppés	Véhicules
Pulvérisation	1,0 % [2 h]	bactéries, levures, virus enveloppés [dont ASF] + fièvre aphteuse	Bâtiments
	0,8 % [2 h]	bactéries, levures et virus nus	
	1,5 % [2 h]	bactéries, levures, fungi et mycobactéries	
	2,0 % [2 h]	oocystes et ascaris	
Nébulisation	0,3 mL/m ³ [2 h]	bactéries, levures, fungi et virus nus	

* Testé selon les dernières normes européennes sur *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus hirae*, *Staphylococcus aureus*, *Proteus vulgaris*, virus de la diarrhée virale bovine, grippe aviaire, peste porcine africaine, *Mycobacterium avium*, *Eimeria* spp., *Cryptosporidium parvum*, *Ascaris suum*

Mode d'emploi

Utiliser à chaque nettoyage des installations pour animaux - diluer dans l'eau entre 1 et 2 % selon l'effet recherché [soit 10 à 20 mL /L de solution]

- Effet bactéricide, levuricide, virucide, fongicide et mycobactéricide

Pulvérisation des locaux :

Désinfecter en appliquant à basse pression, à raison de 200 à 300 mL/m², jusqu'à ruissellement. Laisser agir 1 à 2 heures. Si la température est inférieure à 10 °C, prolonger le temps de d'action. Renouveler après chaque cycle.

En cas de situation sanitaire complexe : appliquer une dilution à 2 % et laisser agir 12 à 24 heures avant de retourner dans les locaux.

Trempage du matériel :

Immerger le matériel propre pendant au moins 30 minutes. Augmenter la durée en cas de basse température.

- Effet cryptosporicide, coccidiocide et ascaricide
Appliquer sur des surfaces propres. Pulvériser à basse pression à raison de 400 à 500 mL/m² sur les sols et les murs [jusqu'à environ 1 m de hauteur]. Laisser agir 2 heures.

Specifications du produit

► Pédiluves et rotoluves

Pédiluves : Remplir avec la solution et placer à l'entrée des bâtiments, à l'abri des intempéries. Faire tremper des bottes propres pendant 1 minute minimum, à 10 °C minimum.

Rotoluves: Installer à l'entrée de l'exploitation. Faire passer les véhicules lentement pour assurer un temps d'action d'au moins 5 minutes. Changer la solution une à deux fois par semaine, selon le niveau de salissure.

► Désinfection des véhicules pour le transport des animaux

Commencer par laver avec un détergent, puis bien rincer. Préparer une dilution à 2 % [20 mL/L]. Appliquer à raison de 100 à 200 mL/m², jusqu'au ruissellement. Laisser agir 5 minutes minimum, à une température d'au moins 10 °C.

► Désinfection par nébulisation à froid

Utiliser 0,3 mL/m³ [ex : 90 mL pour 300 m³]. Laisser agir 2 heures.

Conditions de stockage et d'utilisation

- Ne pas utiliser sur les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.
- Ne pas réutiliser l'emballage.
- Nettoyer les matériels d'application à l'eau.
- Conserver le récipient bien fermé et stocker entre 10 et 30 °C à l'abri de la chaleur dans un endroit bien ventilé.

Présentation

- Bidon de 1 L
- Bidon de 5 L
- Bidon de 20 L
- Fût de 200 L



Prophyl[®] S

Utiliser les produits biocides avec précaution

Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit



DANGER

H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.

H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

