

FLORES DE BARRIÈRE



COVILITE®

Flore bactérienne pour litière



Complexe de 2 souches bactériennes

Orienté positivement la flore bactérienne de la litière

- Installe une flore positive limitant le développement des bactéries pathogènes dans l'environnement animal
- Entre en compétition avec les bactéries pathogènes
- Une utilisation facile grâce aux spores lyophilisées
- Utilisable en agriculture biologique, certifié FR-BIO-01



COVILITE®



Complexe de 2 souches bactériennes

Oriente positivement la flore bactérienne de la litière

● Mode d'emploi

Volaille :

Appliquer sur la litière, même en présence des animaux. Pour un bâtiment de 1000 m², diluer 250g de COVILITE® dans 10 à 20 litres d'eau tiède et pulvériser la solution sur l'ensemble de la litière, en insistant à l'aplomb des mangeoires et des abreuvoirs.

Porc :

En maternité :

Désinfection et séchage de la salle de maternité.

Si le délai entre la désinfection et l'entrée des truies est de moins de 24 heures, rincer les cases une heure après la désinfection. Réaliser une pulvérisation de l'intérieur des cases de maternité : sols, barreaux des cases et cloisons intermédiaires. Installer les truies dans leur case. Seonde pulvérisation sur les truies, après leur entrée en maternité.

Pour une case standard (2.5 x 1.8 m) - surface développée de 10 m² (cloisons, sols, truie) : prévoir une préparation de 500 ml par case et par truie - 50 g dans 4 litres d'eau pour 10 cases.

En post-sevrage :

Désinfection et séchage de la salle de post-sevrage.

Si le vide sanitaire dure moins de 24 heures, rincer les cases une heure après le passage du désinfectant. Alloter les porcelets dans leur case. Réaliser une pulvérisation de l'intérieur des cases : sols, murs à environ 1,2 m du sol et cloisons intermédiaires. Les porcelets sont également pulvérisés au même moment. Le préchauffage des salles est indispensable au confort des porcelets qui seront mouillés après la pulvérisation.

Pour une salle de 100 porcelets / 100 m² de surface (cloisons, sols, porcelets) - 50 g dans 4 litres d'eau.

Pour diluer le produit, utiliser une eau sans trace de désinfectant. COVILITE® peut s'utiliser en présence des animaux.

● Composition

Bactéries vivantes :
Bacillus licheniformis
Bacillus subtilis

● Présentation

1,5 kg

MADE IN
FRANCE

● Nos conseils pour votre élevage

SYNTHÈSE ELEVAGE - 11 Rue Marie Curie - CS 39 - 35137 PLEUMELEUC

Téléphone : 02 99 06 10 06 - Fax : 02 99 06 10 11

Mail : contact@syntheseelevation.com

® Marque déposée par SYNTHÈSE ELEVAGE

